

Тренировочный этап. Решения

10 класс, задача 1


Проектировщик опоры ЛЭП инженер Паратунский имеет чертеж равнобокой трапеции с основаниями a и $15a$ и с углами при большем основании 15° . Ему необходимо отметить на большем основании такую точку, чтобы сумма длин перпендикуляров, опущенных из этой точки на боковые стороны (или их продолжения) была бы максимальной. Сколько таких точек можно найти? В каком отношении они будут делить большее основание?

Решение.

Изобразим трапецию с основаниями AB и CD , произвольную точку F на основании AB и опущенные из нее перпендикуляры FK (на сторону BC) и FM (на продолжение стороны AD).

1. Рассмотрим сначала случай, когда один из перпендикуляров падает на продолжение боковой стороны.

Выполним дополнительные построения: опустим высоту BH из вершины B (на продолжение стороны AD) и построим отрезок FG , параллельный стороне AD (точка G принадлежит BH).



$OFMH$ – прямоугольник (по построению). Его сторона G равна перпендикуляру FM . Сравним FK и AO . Эти отрезки являются катетами в прямоугольных треугольниках FBK и BFG . Но $\angle BFK = \angle BAD = \angle FBK$, следовательно, $\triangle FBK = \triangle BFG$ по острому углу и общей гипотенузе.

Таким образом, $FK = BG$, откуда $FK + FM = BH$, и это равенство не изменяется при перемещении точки F по основанию трапеции.

2. Теперь нужно либо рассмотреть случай, когда оба перпендикуляра падают на боковые стороны «внутри» трапеции. В этом случае все проведенные рассуждения сохраняют силу, так как они не зависят от того, где именно (на стороне или на ее продолжении) находится точка M .

Итак, искомой точкой является любая точка основания AB .

Ответ. Таких точек бесконечно много (любая точка на AB), с их помощью можно разделить большее основание в любом отношении.

10 класс, задача 2

Исследуя прочность опоры ЛЭП, инженер Паратунский пришел к величине

$$P = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{2020^2}\right).$$

Найдите значение P с тремя знаками в дробной части.

Решение.

Выполним преобразования

$$1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n^2 - 1}{n^2} = \frac{(n-1) \cdot (n+1)}{n \cdot n}.$$

Теперь

$$P = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \cdots \cdots \frac{(n-1) \cdot (n+1)}{n \cdot n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}$$

При $n = 2020$ имеем $\frac{1}{2 \cdot 2020} < \frac{1}{1000}$, поэтому с точностью до трех знаков после запятой $P(2020) = 0,500$.

Ответ. $P(2020) = 0,500 \pm 0,001$.

10 класс, задача 3.

В пятиугольнике одна сторона имеет длину 2 см, остальные — по 1 см. Можно ли в такой пятиугольник вписать окружность?

Решение.

Пусть $AB=1$, $BC=2$, $CD=2$, A_1, B_1, C_1 точки кас. вписанной окр. и этих сторон, тогда $A_1B = BB_1 = x$, $B_1C = CC_1 = y$, $C_1D = z$, $AA_1 = t$,

$$\begin{cases} x & +t = 1, \\ x + y & = 2, \\ y + z & = 1. \end{cases}$$

Складывая, получаем $2(x+y) + z + t = 4$, $x+y+(1/2)(z+t) = x+y = 2$, откуда $z+t = 0$, что невозможно, так как $z > 0$ и $t > 0$.

Ответ: нет.

10 класс, задача 4.

Для арифметической прогрессии a_1, a_2, a_3, \dots выполняются условия $a_m = n$, $a_n = m$ при некоторых различных фиксированных m и n . Найдите a_{m+n} .

Решение.

Вычитая равенства $a_m = a_1 + d(m - 1) = n$ и $a_n = a_1 + d(n - 1) = m$, получаем $d(m - n) = n - m$, откуда $d = -1$ и $a_1 = a_n - (n - 1)(-1) = m + n - 1$. Тогда $a_{m+n} = 0$.

Ответ: 0.

10 класс, задача 5

Вариант 1

Решите уравнение в целых числах $19x + 21y = 800$.

Решение. В общем виде

Требуется найти все решения уравнения

$$ax + by = k(a + b), \quad a > 0, b > 0, \text{НОД}(a, b) = 1, k > 0,$$

в целых числах.

Легко проверить, что решением является $x = y = k$.

Перепишем уравнение в виде

$$a(k + mb) + b(k - ma) = k(a + b)$$

Пусть $ax_1 + by_1 = ax_2 + by_2 = k(a + b)$, где $x_1 = y_1 = k$.

Тогда $a(k - x_2) + b(k - y_2) = 0$ или $a(k - x_2) = b(y_2 - k)$, откуда $k - x_2$ должно быть кратно b и $y_2 - k$ должно быть кратно a .

Таким образом, решением являются $x = k - mb$, $y = k + ma$, $m \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = 20 - 19m$, $y = 20 + 22m$, $m \in \mathbb{Z}$.

Примечание

Запись вида $x = k + mb$, $y = k - ma$, $m \in \mathbb{Z}$ также является верным ответом. За формат записи баллы не снижаются.