

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
ВАРИАНТ 21101 для 10-го класса

1. Петя и Катя делают модели воздушных шаров, наполняя гелием стандартную резиновую оболочку. Катя сделала свою летающую модель с максимальной массой корзины m . Петя решил сделать модель с корзиной массой $2m$. Для этого он надул гелием резиновую оболочку своего шара до вдвое большего объёма. Взлетит ли модель Пети?

Ответ: Шар Пети не взлетит.

2. Фигура в форме куба спаяна из 12 тонких проволочек длиной l каждая и расположена таким образом, что две грани куба горизонтальны. Куб подсоединен к источнику постоянного тока в двух вершинах, расположенных на главной диагонали, и находится в однородном магнитном поле, линии индукции которого вертикальны. Определите результирующую силу Ампера, действующую на куб, если сила тока в подводящих проводах равна I , а модуль магнитной индукции равен B . Сделайте рисунок.


Ответ: $F_A = IBl\sqrt{2}$.

3. Три одинаковых однородных стержня заряжены с одинаковыми линейными плотностями зарядов и образуют в вакууме правильный треугольник. Потенциал электростатического поля в центре масс этого треугольника равен Φ_0 . После того, как один из стержней был убран, напряжённость электростатического поля в этой точке стала равна E_0 . Определите напряжённость и потенциал электростатического поля в той же точке после того, как будет убран ещё один стержень. Перераспределением зарядов в стержнях пренебречь. Сделайте рисунок.


Ответ: $E_1 = E_0$, а $\Phi_1 = \frac{\Phi_0}{3}$

4. На шероховатом горизонтальном столе лежит шероховатый цилиндр. На цилиндр намотана нить. Конец нити тянут под углом вверх с силой F (см. рис.). При этом цилиндр вращается, но не сдвигается с места. При каком минимальном значении силы F возможна такая ситуация? Масса цилиндра m , коэффициент трения между цилиндром и столом равен μ .

Ответ: $F = \frac{\mu mg}{\sqrt{1+\mu^2}}$.



5. Старшеклассники Петя и Катя дружат с детства, но в последнее время они долго не встречались и очень соскучились друг по другу. Однажды летом Петя шёл по берегу канала шириной h и увидел на другом берегу вдалеке (на расстоянии $S = 3h$ вдоль берега реки) Катю (см. рис.). Петя решил сначала побежать вдоль канала, а потом вплавь пересечь его, чтобы оказаться рядом с Катей. Найдите минимальное время, необходимое Петя для того, чтобы осуществить его план, если он плавает со скоростью v , а бегает со скоростью $3v$. Вода в канале неподвижна.



Ответ: $t_{min} = \frac{S+2\sqrt{2}h}{3v} = \frac{h}{v} \left(1 + \frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$